

# Analyse II

# Examen

## Partie commune

## Printemps 2022

---

### Réponses

---

Pour les questions à **choix multiple**, on comptera :

- +3 points si la réponse est correcte,
- 0 point si la question n'est pas répondue ou s'il y a plusieurs réponses,
- 1 point si la réponse est incorrecte.

Pour les questions de type **vrai-faux**, on comptera :

- +1 point si la réponse est correcte,
- 0 point si la question n'est pas répondue ou s'il y a plusieurs réponses,
- 1 point si la réponse est incorrecte.

## Première partie, questions à choix multiple

Pour chaque question, marquer la case correspondante à la réponse correcte sans faire de ratures. Il n'y a qu'**une seule** réponse correcte par question.

**Question 1 :** La solution  $y(x)$  de l'équation différentielle

$$y''(x) + 2y'(x) - 3y(x) = 9x$$

qui satisfait les conditions initiales  $y(0) = 4$  et  $y'(0) = 3$  vérifie aussi

- $y(1) = 2e^3 - 1$         $y(1) = 1 - 2e^3$         $y(1) = 6e - 5$         $y(1) = 5 - 6e$

**Question 2 :** Soit  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$F(t) = \int_4^{t^2} e^{tx^2} dx.$$

Alors

- $F'(2) = 0$         $F'(2) = 4e^{32}$         $F'(2) = e^{32}$         $F'(2) = 2e^{32}$

**Question 3 :** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y) = \frac{\tan(3x^2 + y^2)}{3x^2 + y^2}.$$

Alors

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 1$   
  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$  n'existe pas  
  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = -1$   
  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$

**Question 4 :** Soit  $D$  le sous-ensemble de  $\mathbb{R}^2$  donné par

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Alors l'intégrale

$$\int_D xy^3 dx dy$$

vaut

- $\frac{8}{3}$         $\frac{16}{3}$         $\frac{16}{5}$         $\frac{8}{5}$

**Question 5 :** La solution  $y(x)$  de l'équation différentielle

$$y'(x) = (y(x))^2 \frac{\cos(x)}{(2 + \sin(x))^2}$$

qui satisfait la condition initiale  $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{3}{4}$  vérifie aussi

- $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{4}$         $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{4}{3}$         $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{5}{7}$         $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{5}{3}$

**Question 6 :** Le sous-ensemble

$$A = \{(x, 0, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 5z^2 < 10\} \subset \mathbb{R}^3$$

- est borné et ouvert
- est borné et non ouvert
- est non fermé et non borné
- est fermé et ouvert

**Question 7 :** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y) = 3x^2y - x^3 - 3y^4.$$

Alors

- le point  $(2, 1)$  est un point stationnaire de  $f$  mais n'est pas un point d'extremum local de  $f$
- le point  $(2, 1)$  est un point de minimum local de  $f$
- le point  $(2, 1)$  est un point de maximum local de  $f$
- le point  $(2, 1)$  n'est pas un point stationnaire de  $f$

**Question 8 :** Soient  $f_1, f_2, \dots, f_m : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  des fonctions de  $n$  variables et soit  $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  définie par

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x})) \quad \text{pour tout } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Alors

- il est possible que  $\mathbf{f}$  soit différentiable même si  $f_j$  est discontinue pour un certain  $j \in \{1, \dots, m\}$
- si la matrice jacobienne de  $\mathbf{f}$  existe partout, alors  $\mathbf{f}$  est différentiable
- $\mathbf{f}$  est forcément différentiable
- si  $\mathbf{f}$  n'est pas différentiable, alors il existe  $j \in \{1, \dots, m\}$  tel que  $f_j$  n'est pas de classe  $C^1$

**Question 9 :** Soit  $D$  le sous-ensemble de  $\mathbb{R}^3$  donné par

$$D = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq y \leq x, z \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, z^2 \leq x^2 + y^2 \}.$$

Alors l'intégrale

$$\int_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$$

est égale à

$\int_1^3 \left( \int_0^{\pi/4} \left( \int_0^{\pi/4} r \sin^2(\theta) d\varphi \right) d\theta \right) dr$

$\int_1^3 \left( \int_{\pi/4}^{\pi/2} \left( \int_0^{\pi/4} r \sin^2(\theta) d\varphi \right) d\theta \right) dr$

$\int_1^3 \left( \int_0^{\pi/4} \left( \int_{\pi/4}^{\pi/2} r \sin^2(\theta) d\varphi \right) d\theta \right) dr$

$\int_1^3 \left( \int_0^{\pi/2} \left( \int_0^{\pi/2} r \sin^2(\theta) d\varphi \right) d\theta \right) dr$

**Question 10 :** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \sin(|y|)}{\sqrt{3x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Alors la dérivée directionnelle de  $f$  en  $(0, 0)$  suivant le vecteur  $\mathbf{v} = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^\top$

n'existe pas

vaut  $\frac{1}{2}$

vaut 0

vaut  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

**Question 11 :** La solution  $y(x)$  de l'équation différentielle

$$y'(x) - \frac{4}{x} y(x) = x^4 + x^2$$

qui satisfait la condition initiale  $y(1) = -2$  vérifie aussi

$y(2) = 32$

$y(2) = 8$

$y(2) = -8$

$y(2) = -16$

**Question 12 :** Soit  $(\mathbf{a}_n)$  la suite d'éléments de  $\mathbb{R}^3$  définie par

$$\mathbf{a}_n = \left( 2 + \frac{1}{n}, \frac{(-1)^n}{n}, \frac{3n^2 - n + 1}{2n^2 + e^n + 1} \right), \quad \text{pour tout } n \in \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Alors

- la suite n'est pas bornée
- la suite converge vers  $(2, 0, \frac{3}{2})$
- la suite est bornée mais ne converge pas
- la suite converge vers  $(2, 0, 0)$

**Question 13 :** L'intégrale

$$\int_0^1 \left( \int_{\sqrt{y}}^1 \cos(x^3) dx \right) dy$$

vaut

- $\frac{1}{3} (1 - \sin(1))$
- $\sqrt{\sin(1)}$
- $\frac{1}{3} \sin(1)$
- $\frac{1}{3} \sqrt{\sin(1)}$

**Question 14 :** Soit  $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < \frac{1}{4} \right\}$  et soit  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y) = \frac{\ln(1 + x + y)}{1 + x - y}.$$

Alors le polynôme de Taylor d'ordre deux de  $f$  autour du point  $(0, 0)$  est

- $p_2(x, y) = x + y - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - xy$
- $p_2(x, y) = x + y - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2 - xy$
- $p_2(x, y) = x + y + \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}y^2 + xy$
- $p_2(x, y) = x + y + \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}y^2 - xy$

**Question 15 :** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y) = xy^2$$

et soit  $g(x, y) = 2x^2 + y^2 - 6$ . Alors, sous la contrainte  $g(x, y) = 0$ ,

- la valeur minimale de  $f$  est égale à  $-8$
- la valeur minimale de  $f$  est égale à  $-2$
- la valeur minimale de  $f$  est égale à  $-6$
- la valeur minimale de  $f$  est égale à  $-4$

**Question 16 :** Soit  $\mathbf{g} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  la fonction définie par

$$\mathbf{g}(x, y, z) = (x^2 + y^2 + 1, yz)$$

et soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $C^1$  telle que

$$J_f(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{2}{u} + 2v & 2u \end{pmatrix}.$$

Alors la fonction composée  $h = f \circ \mathbf{g} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  satisfait:

$\frac{\partial h}{\partial y}(-1, 0, 1) = 4$

$\frac{\partial h}{\partial y}(-1, 0, 1) = -2$

$\frac{\partial h}{\partial y}(-1, 0, 1) = 0$

$\frac{\partial h}{\partial y}(-1, 0, 1) = 2$

**Question 17 :** Soit  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0\}$  et soit  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y) = 2x^y - y^x - 1.$$

L'équation  $f(x, y) = 0$  définit implicitement dans un voisinage de  $x = 1$  une fonction  $y = g(x)$  qui satisfait  $g(1) = 1$  et  $f(x, g(x)) = 0$ . La valeur de  $g'(1)$  est alors

$g'(1) = -2$         $g'(1) = 2$         $g'(1) = 0$         $g'(1) = -1$

**Question 18 :** Soit  $S$  la surface

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + 2xz = 4\}$$

et soit  $z_0 \in \mathbb{R}$  tel que  $(1, 1, z_0) \in S$ . Alors

l'équation du plan tangent à  $S$  au point  $(1, 1, z_0)$  est  $2x + 2y + 2z - 6 = 0$

l'équation du plan tangent à  $S$  au point  $(1, 1, z_0)$  est  $2x + y + z - 4 = 0$

la valeur de  $z_0$  n'est pas unique

l'équation du plan tangent à  $S$  au point  $(1, 1, z_0)$  est  $2z - 4x - 2y + 8 = 0$

## Deuxième partie, questions de type Vrai ou Faux

Pour chaque question, marquer (sans faire de ratures) la case VRAI si l'affirmation est **toujours vraie** ou la case FAUX si elle **n'est pas toujours vraie** (c'est-à-dire si elle est parfois fausse).

**Question 19 :** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur un ouvert  $U \subset \mathbb{R}^n$  et soit  $\mathbf{x}_0 \in U$ .

Si  $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ , alors  $\mathbf{x}_0$  est un point d'extremum local de  $f$ .

VRAI       FAUX

**Question 20 :** Soient  $A$  et  $B$  deux sous-ensembles non vides de  $\mathbb{R}^n$ . Si  $A$  est un ensemble fermé et  $B$  est un ensemble ouvert, alors  $C = \{\mathbf{x} \in B : \mathbf{x} \notin A\}$  est un ensemble ouvert.

VRAI       FAUX

**Question 21 :** Soient  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$  tels que  $f(\mathbf{a}) = 1$ . Soit  $(\mathbf{a}_k)_{k \geq 1}$  une suite de  $\mathbb{R}^n$  qui converge vers  $\mathbf{a}$ . Si  $\lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}_k) = 1$ , alors  $f$  est continue en  $\mathbf{a}$ .

VRAI       FAUX

**Question 22 :** Soit  $A$  un sous-ensemble non vide de  $\mathbb{R}^3$  tel que  $A \neq \mathbb{R}^3$ .

Si le bord  $\partial A$  est borné, alors  $A$  est borné.

VRAI       FAUX

**Question 23 :** Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction. Si les dérivées partielles  $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$  et  $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$  existent, alors la dérivée directionnelle  $Df((0, 0), \mathbf{v})$  existe et est égale au produit scalaire de  $\nabla f(0, 0)$  avec  $\mathbf{v}$ , pour tout  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$  tel que  $\sqrt{v_1^2 + v_2^2} = 1$ .

VRAI       FAUX

**Question 24 :** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur un ouvert  $U \subset \mathbb{R}^n$  et soit  $\mathbf{x}_0 \in U$  tel que les dérivées partielles  $\frac{\partial f}{\partial x_j}$  existent dans un voisinage de  $\mathbf{x}_0$  pour tout  $j \in \{1, \dots, n\}$ .

Si  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{x}_0)$  pour tout  $j \in \{1, \dots, n\}$ , alors  $f$  est continue en  $\mathbf{x}_0$ .

VRAI       FAUX

**Question 25 :** Soit  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et soit  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ . Si les dérivées directionnelles  $Df(\mathbf{a}, \mathbf{v})$  existent et sont continues dans un voisinage de  $\mathbf{a}$  pour tout  $\mathbf{v}$ , alors la fonction  $f$  est différentiable en  $\mathbf{a}$ .

VRAI       FAUX

**Question 26 :** Soit  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ . Alors

$$\int_D \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz \geq \frac{2\pi}{3}.$$

VRAI       FAUX

**Question 27 :** Soit  $E \subset \mathbb{R}^n$  un sous-ensemble fermé et soit  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue. Si  $f$  est bornée et admet au moins un point de maximum global sur  $E$ , alors  $E$  est borné.

VRAI       FAUX

**Question 28 :** Soit  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction différentiable. Soit  $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : F(\mathbf{x}) = 0\}$  la surface de niveau 0 de  $F$ .

Si  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in S$  sont tels que les plans tangents à  $S$  en  $\mathbf{a}$  et  $\mathbf{b}$  sont parallèles, alors  $\nabla F(\mathbf{a}) = \nabla F(\mathbf{b})$ .

VRAI       FAUX